

Pleurotus eryngii

Kuningservik

- kiire kasvusubstraadi koloniseerimine ning viljumine
- paksu, lihava jalaga seenekübarad, hõrgu aroomi ja heade säilivusomadustega



Paksu lihava jalaga servikutüvi. Kübar hallikaspruun, sageli muhklik 7-10cm läbimõõduga. Tugeva tekstuuri ja hõrgu aroomiga, heade säilivusomadustega.

Kasvatamisjuhised:

Soovitav kasvusubstraat	Lehtpuupuidu ja (nisu)põhu segu
Substraadi kuumtöötlus	Pastöriseerimine: temperatuur substraadimassi keskel 4h @ 62°C
Inokulatsioon	Segada substraadi sekka ±3%
Inkubeerimine	Ruumi temperatuur 23-25°C
	Substraadi temperatuur 25-28°C
	Kestvus 10-15 päeva
Viljakehade tekke stimuleerimine	Temperatuur langetada 18°C
Viljakehade kasvuperiood	Kasvuruumi temperatuur 12-15°C
	Relatiivne õhuniiskus 95-97%
	CO ₂ kontsentratsioon madalam, kui 1200ppm
	Valgustus 800-1500 lux
Saagikoristus	Kasvulaineid 2
	Vahemikuga 7-14 päeva
	Kasvulainete vahel relatiivne õhuniiskustase 90%
Terve kasvuperioodi pikkus	~2 kuud